

作物名	大根	圃場番号	面積	前作
品種	夏つかさ	A	10a	

生産者名 \_\_\_\_\_

標準防除回数

春作3回

秋作5回

播種日	商品名	成分	施肥量	農薬項目 農薬番号	土壌処理	防除1	防除2	防除3	防除4	防除5	防除6	出荷予定日	確認	収穫始り	収穫終了
1	9月10日	トモエ化成	6.7.7	160kg/10a	農薬番号	1	7	10	13			11月9日	11月8日	11月9日	11月11日
					使用日	7月25日	9月10日	9月30日	10月10日						
2	9月13日	トモエ化成	6.7.7	160kg/10a	農薬番号	1	7	10	13			11月12日	11月11日	11月12日	11月16日
					使用日	7月25日	9月13日	9月30日	10月10日						
3					農薬番号										
4					農薬番号										
5					農薬番号										
6					農薬番号										

使用基準					
No	病害虫	農薬名	10a当使用量	使用時期	使用回数
1	ネコブセンチュウ	DD92	10~15L	作付の10~15日前	1
2	ネコブセンチュウ	テロ92	10~15L	作付の10~15日前	1
3	亀裂褐変症	リゾレックス粉剤	20~40kg	播種前迄	1
4	センチュウ類	ティトラベックス油剤	20~30L	播種の21日前迄	1
5	亀裂褐変症	ピクリン80	1穴当2~3ml		1
6	シロサビ病 ワッカ症	ランマンフロアブル	2000倍	3日前迄	3
7	キスシノミハムシ	フォース粒剤	4kg		1
8	亀裂褐変症	バシタック水和剤	1000~1500倍	21日前迄	3
9	コナガ、アオムシ	アフーム乳剤	1000~2000倍	7日前迄	3
10	アブラムシ、コナガ ヨトウ、アブラムシ シンクイムシ	レルダン乳剤	1000倍	30日前迄	2
11	コナガ、ヨトウムシ	ブレオフロアブル	1000倍	14日前迄	2
12	コナガ、アオムシ	トルネードフロアブル	1000~2000倍	21日前迄	3
13	ハイマダラメイガ	ハチハチ乳剤	1000~2000倍	14日前迄	2
14	軟腐病	スターナ水和剤	1000倍	21日前迄	3
15	コナガ、アオムシ	バシレックス水和剤	1000~2000倍	発生初期収穫前日	4
16	コナガ、アオムシ	エスマルクDF	1000~2000倍	発生初期収穫前日	4
17	アオムシ、ヨトウムシ タナキンウリハ アブラムシ類 コナガ、キスシノミハムシ	サイアノックス乳剤	1000~1500倍	14日前迄	2
18	キスシノミハムシ ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	ラグビーMC粒剤	20~30kg		
19	シロサビ病	リドミル粒剤2	9kg	播種時	1
20	アブラムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	3000倍	7日前迄	3

